

# Fyrremejse *Poecile montanus*

## Willow tit



Fyrremejsen er indvandret til Danmark fra Tyskland i 1970'erne og findes primært i det sydligste Jylland i løv- og blandingsskov eller nåleplantager på mager jord. Arten er udbredt i hele Nord- og Mellemeuropa, i bjergområder på Balkan, i et bredt bælte til den sibiriske Stillehavskyst samt det nordøstligste Kina og Japan.

Fyrremejsen er, som sumpmejsen, generelt en udpræget standfugl i Vesteuropa, mens de nordskandinaviske bestande kan lave irregulære vandringer over større afstande (Harrap & Quinn 1996).

### Mærknings- og genmeldingsdata

Den første fyrremejse blev mærket i Danmark i 1992. Siden er der mærket i alt 19 med fem i 2000 som den

største årstotal. Én af de ringmærkede fyrremejser er genfundet. Den blev mærket som ungfugl 3. oktober 1998 ved Vester Vedsted, Ribe og blev fanget og frigivet samme sted 25. december samme år.

### English summary

*The willow tit colonised Denmark in the 1970s and now breeds mainly in southern Jutland. In Denmark the first willow tit was ringed in 1992. In total 19 birds have been ringed, with the highest number ringed in 2000 (5). One of the ringed birds has been recovered: it was ringed as a juvenile on 3 October 1998 in southwestern Denmark and recovered at the same location on 25 December the same year.*