


Sortstrubet lom *Gavia arctica*

Black-throated diver



Den sortstrubede lom yngler i store dele af de nordlige egne af Europa og Asien. Arten yngler ikke i Danmark, men de danske havområder, specielt Vadehavet og det nordlige Kattegat er vigtige fældnings- og overvintringsområder (Danielsen m.fl. 1993, Durinck m.fl. 1994, Laursen m.fl. 1997), formodentlig primært for skandinaviske og russiske ynglefugle (Fransson & Pettersson 2001). Fuglene er pga. fældning flyveudygtige i en del af vinterperioden.

Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark er der i alt ringmærket 14 sortstrubede lommer. Disse fugle er fanget i fiskenet, de fleste i farvandet omkring Bornholm i årene 1967-1971, eller er fugle, som har været indsmurt i olie og efter rengøring er sluppet fri.

Der foreligger kun én genmelding, men den er til gengæld ret bemærkelsesværdig. Det drejer sig om en førstearsfugl, som 13. november 1968 blev mærket i farvandet vest for Bornholm og 15. september 1970 blev skudt på Sibiriens tundra, 3759 km mod nordøst (fig. 1). Hovedparten af de nordrussiske fugle menes at overvintrie ved Sortehavet og Det Kaspiske Hav, men denne genmelding viser altså, at i det mindste nogle nordrussiske fugle opholder sig i Østersøen allerede i november, eventuelt for at drage videre mod sydlige vinterkvarterer (Cramp & Simmons 1977). Ellers er de sortstrubede lommer kendt for et sløjfetræk (se kap. 4), idet sibiriske fugle overvejende trækker til Sortehavet, men om foråret lægger vejen omkring Østersøen pga. den sene issmelting i indlandsområderne (Salomonsen 1967).




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for sortstrubet lom ringmærket i Danmark. Linje forbinder mærknings- og genmeldingssted.
Ringing and recovery site of the only black-throated diver ringed in Denmark and later recovered. Line connect ringing and recovery site.




Fig. 2. Mærknings- og genfundslokaliteter for sortstrubet lom mærket i udlandet og genfundet i Danmark (n=6). Ringing and recovery sites of black-throated diver ringed abroad and recovered in Denmark (n=6).

I alt seks fugle ringmærket i udlandet er genfundet i Danmark (fig. 2). To er mærket som redeunger i Mellemværige og senere genfundet i det nordlige Jylland. De øvrige fire er mærket i Kaliningrad og senere genfundet i det sydlige og østlige Danmark. De udenlandske fugle er fundet fra 10. oktober til 27. januar. Fem af dem er skudt (i perioden 1935-1954), og én er druknet i et fiskenet.

English summary

The black-throated diver does not breed in Denmark; however, in particular the Kattegat and the Wadden Sea are important moulting and wintering areas. In Denmark 14 black-throated divers have been ringed, most in the Baltic Sea around the island of Bornholm. One of these birds was later recovered in Siberia 3,759 km from the ringing site. This bird was ringed on 13 November 1968 and recovered on 15 September 1970. Two birds from Sweden and four from Kaliningrad have been recovered in Denmark from mid-October to the end of January.