

Vagtel *Coturnix coturnix*

Quail



Vagtlén er udbred over store dele af Europa, med de største bestande i Rusland, Spanien og Frankrig (BirdLife International 2004). Den danske bestand har været voksende siden 2000, og vurderes i 2003 til 100-200 ynglepar (Grell m.fl. 2004). Vagtlén er den eneste trækfugl blandt de europæiske hønsefugle, og arten overvintrer i Afrika syd for Sahara og i mindre grad i Middelhavsområdet. I Danmark ses vagtler sjældent på træk, men kan i visse år optræde invasionsagtigt.

Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark er der ringmærket 12 vagtler, 11 i 1951 og én i 1992. Ingen af de mærkede fugle er genmeldt.



Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundlokaliteter for vagtel ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=2). Ringing sites connected to recovery sites for quail ringed abroad and recovered in Denmark (n=2).

Der er fundet to vagtler ringmærket i udlandet. Den ene, ringmærket som mindst et-årig 30. maj 1924 i det vestlige Frankrig, blev genfundet 17. juli samme år nord for Mariager Fjord (fig. 1). Den anden var ringmærket 4. maj 1947 i Norditalien og blev genfundet i Salling 20. juli samme år, hvor perioden maj-september var usædvanlig varm og tør (Rosenørn & Lindhardt 2000).

English summary

The quail is a rather rare breeder in Denmark with 100–200 breeding pairs. Invasions occur in some years. Twelve quails have been ringed in Denmark, but none was subsequently recovered. Quails ringed in France and Italy has been recovered in Denmark. The first was ringed on 30 May 1924 and recovered on 17 July the same year; the second was ringed on 4 May 1947 and recovered on 20 July the same year.