


Almindelig skråpe *Puffinus puffinus*

Manx shearwater



Almindelig skråpe yngler i kolonier på øer ved Island, Færøerne, De Britiske Øer og i Frankrig. I Danmark optræder almindelig skråpe fåtalligt, oftest ved den jyske vestkyst i juli-august (Lange 2005). Arten ses hovedsagelig i forbindelse med kraftig vestenvind. De fleste almindelige skråper trækker om efteråret mod sydvest over Atlanterhavet for at overvinde i farvande ud for Sydamerikas østkyst (Cramp & Simmons 1977, Wernham m.fl. 2002).




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for almindelig skråpe ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=2). Linjer forbinder mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery locations for manx shearwater ringed abroad and recovered in Denmark (n=2). Lines connect ringing and recovery site.

Mærknings- og genmeldingsdata

Der er ikke ringmærket almindelige skråper i Danmark, men to fugle ringmærket i udlandet er genfundet i Danmark (fig. 1). Begge fugle stammer fra De Britiske Øer. Den ene fugl blev ringmærket som unge 29. august 1970 ved Nordirlands østkyst og senere fundet død ved Esbjerg 21. september samme år. Den anden var ringmærket som voksen 16. august 1984 på Bardsey ud for Wales og blev genfundet 20. juli 1993 ved Hvide Sande.

English summary

The manx shearwater does not breed in Denmark and, as a rare summer and autumn visitor, has never been ringed in Denmark. However, two ringed birds have been recovered. Both were ringed in Great Britain and recovered on the Danish west coast, one in July and one in September.