

Gråstrubet lappedykker *Podiceps grisegena*

Red-necked grebe



Gråstrubet lappedykker er i Danmark en ret almindelig ynglefugl med de tætteste bestande i den østlige del af landet. Uden for Danmark yngler arten i Østersøområdet og i store dele af det østlige Europa, i Vest- og Østasien samt i Nordamerika. I Danmark samles fuglene sent på sommeren i store fældeforekomster i de indre farvande, bl.a. Sejerøbugten (Pihl 1995). Fuglene har vinterkvarter langs Østersøens sydkyst og




Fig. 1. Mærknings- og genmeldingslokaliteter for gråstrubet lappedykker ringmærket eller genmeldt i Danmark (n=6). Linjer forbinder mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery sites of red-necked grebe ringed or recovered in Denmark (n=6). Lines connect ringing and recovery site.

i Bælthavet men trækker til den europæiske vestkyst i hårde vintre. De nordskandinaviske og nordrussiske bestande trækker derimod stik vest til fældning og overvintring ved Norges vestkyst (Fjeldså 2004).

Mærknings- og genmeldingsdata

Lappedykkere er svære at fange, og i Danmark er der fra 1940 til 2002 kun ringmærket 30 gråstrubede lappedykkere. Det højeste årlige antal mærkninger var fire i 1955. Af de mærkede fugle er tre (10 %) genmeldt. Desuden er der i Danmark fundet tre gråstrubede lappedykkere mærket i udlandet.

En af de mærkede fugle er genfundet i udlandet. Denne fugl blev mærket på Amager som trækfugl i oktober og genmeldt i yngletiden i Finland, 1.023 km fra mærkningsstedet (fig. 1). To fugle mærket i det sydlige Finland er tilsvarende genmeldt i Danmark (fig.1). Den ene blev fundet i februar, den anden er uden datoangivelse. En gråstrubet lappedykker mærket i det sydlige Tyskland (26. august) er desuden genmeldt i februar i Danmark.

En enkelt genmelding viser, at nogle danske fugle vender tilbage til deres udklækningslokalitet. Således er en redeunge fra Vejlerne som treårig afløst få kilometer fra mærkningsstedet i april. En anden fugl blev mærket som voksen i april på Amager, og fundet død ved Roskilde tre år senere, 28 km fra mærkningsstedet.

De to genmeldinger af danske ynglefugle afslører således ikke fuglenes trækforhold og vinteropholdssteder, og vores viden på det område må fortsat siges at være mangelfuld.

English summary

The red-necked grebe is a fairly common breeding bird in Denmark. Only 30 red-necked grebes have been ringed and three have been recovered, one abroad. This recovery from southern Finland and two additional recoveries in Denmark of Finnish-ringed birds indicates that part of the Danish winter population is of Finnish origin. At the moment very little is known about the migration and winter quarters of the Danish breeding population.