

Purpurhejre *Ardea purpurea*

Purple heron

Purpurhejren yngler i Afrika og det sydlige Europa og herfra østpå gennem det centrale Asien og Indien. I Vesteuropa er udbredelsen relativt spredt med større bestande i Frankrig, Spanien, Italien og Ungarn. Tættest på Danmark er ynglebestanden i Holland, som talte omkring 400 ynglepar i 1998-2000 (BirdLife International 2004). Ungfuglene spredes i deres første sommer i alle retninger, mens det egentlige træk hovedsagelig går til overvintringslokaliteter syd for Sahara. Arten er en meget sjælden gæst i Danmark med kun 19 godkendte observationer indtil 2001 (Ortvad m.fl. 2002).



Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for purpurhejre ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=1). Linje angiver direkte efterårstræk. Ringing and recovery site for purple heron ringed abroad and recovered in Denmark (n=1). Line indicate direct autumn migration

Mærknings- og genmeldingsdata

Der er aldrig ringmærket purpurhejrer i Danmark. En fugl ringmærket i udlandet er dog genfundet her i landet. Fuglen, der stammede fra den hollandske bestand, var ringmærket som unge 23. juni 1981, og blev genfundet syd for Ribe 28. august samme år (fig. 1).

English summary

The purple heron is a very rare visitor in Denmark and has never been ringed. One bird in its first year from the nearest population in the Netherlands was recovered in southern Jutland on 28 August 1981.