

Rovterne *Hydroprogne caspia*

Caspian tern



Rovternen yngler i de fleste verdensdele, dog oftest ret spredt og relativt fåtalligt. I Europa yngler arten ved Østersøen og Sortehavet, samt enkelte steder i Spanien. Rovterne fra Østersøens kolonier overvintrer langs kysterne af Vestafrika, specielt i Guineabugten, samt ved Nigerflodens indlandsdelta. I Danmark er rovternen en sjælden trækgæst om efteråret, hvor trækket indledes i juni og toppe i juli-august. Om foråret optræder kun ganske få fugle i april og maj.




Fig. 1. Mærkningslokalitet forbundet til genfundlokalitet for rovterne ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=8). Ringing location connected to recovery site for caspian tern ringed abroad and recovered in Denmark (n=8).

Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark er der ringmærket tre rovterner i 1931, hvor arten ynglede på Saltholm, men ingen af disse fugle er genfundet. Der er fundet otte rovterner ringmærket i udlandet. Alle disse fugle stammer fra ynglekolonier ved Østersøen, heraf fem i Sverige, to i Finland og en i Estland. Fire af de genmeldte fugle var i første leveår, to i tredje leveår og to i fjerde leveår. De svenske rovterner er alle fundet i Thy, heraf tre i Vejlerne og to ved Agger (fig. 1). Fire af de svenske fugle er fundet i august, den sidste i september, alle i 1960'erne og 1970'erne. De to finske rovterner er fundet hhv. i Vadehavet (25. juli) og på Sjælland (3. august). Den estiske rovterne blev fundet på Bornholm 5. august.

English summary

The Caspian tern is a rare migrant in Denmark, most often seen in July–August. Three Caspian terns have been ringed in Denmark in 1931, when the species as an exception bred in Denmark. None of the three birds was recovered. However, eight ringed birds from populations in the Baltic Sea have been found in Denmark: five birds from Sweden were all found in northern Jutland, one Estonian bird was found on Bornholm and two Finnish birds were found in the Wadden Sea and on Zealand.