


# Skestork *Platalea leucorodia*

## Spoonbill



Danmark huser verdens nordligste skestørke i kolonier ved Limfjorden og Skjern Å. Skestørken vendte tilbage som ynglefugl i 1996, efter 27 års fravær, og et voksende antal fugle har siden ynglet - i 2004 22 par (J. Skrivers, pers. medd.). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som *sårbar*. Skestørkens europæiske udbredelsesområde strækker sig fra Tjekkiet og Balkan mod øst, med enkelte kolonier i Sydspanien og Holland. De hollandske kolonier havde i 2002 mere end 1.400 par (J. Skrivers, pers. medd.).



Fig. 1. Samtlige genmeldinger af skestørke mærket i Danmark (gul, n=4) samt mærkningslokaliteter (grøn, n=5) for fugle mærket i udlandet og genmeldt i Danmark. Linjer angiver direkte efterårstræk. All recoveries of spoonbill ringed in Denmark (yellow, n=4) and ringing sites (green, n=5) of spoonbill ringed abroad and recovered in Denmark. Lines indicate direct autumn migration.

### Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark blev den første skestørke ringmærket i 1944, og indtil 2002 er det blevet til i alt 16 mærkninger. Alle fuglene er mærket i Han Herred nord for Limfjorden. I 1944 blev der mærket fire unger i Selbjerg Vejle, og i 1964 og 1965 blev der i Arup Vejle mærket henholdsvis syv og fem unger. Den danske ringmærkning af skestørke har givet fire genmeldinger. Siden 2003 har man farveringmærket unger, og nogle af de foreløbige resultater af dette arbejde er beskrevet i særskilt afsnit. I Danmark er desuden genfundet fem skestørke ringmærket i udlandet.

### Træk og overvintring

De fire genfund af danskmærkede fugle er alle fra efterårstrækket i fuglenes første leveår. Fuglene er genfundet i Syd- og Nordvestfrankrig, samt i det sydlige Spanien (fig. 1). Store dele af de nordvesteuropæiske skestørke menes at overvintringe i det tropiske vadehavsområde Banc d'Arguin i Mauretania vest for Sahara (Overdijk 2004). Placeringen af de danske efterårsgenmeldinger kunne tyde på, at de danske fugle, i lighed med de hollandske (Overdijk 2004), trækker langs Atlanterhavskysten til Vestafrika. De unge hollandske skestørke bliver i mange tilfælde i Vestafrika indtil kønsmodenhed (Overdijk 2004).

### Fakta Facts

<b>Mærkninger</b> <i>Birds ringed</i>	16
<b>Genmeldinger</b> <i>Recoveries</i>	
Antal genmeldinger <i>No. of recoveries</i>	4
-heraf uden for Danmark <i>Recovered abroad</i>	4(100%)
Antal fugle <i>No. of individuals</i>	4
-heraf mærket som unger <i>Ringed as chicks</i>	4(100%)
Genmeldingsandel <i>Proportion recovered</i>	25%
Mærket i udlandet and genmeldt i Danmark <i>Ringed abroad and recovered in Denmark</i>	5

### Ekstremer *Extremes*

Højeste alder <i>Oldest bird</i>	122 dage
Længste afstand <i>Longest dist.</i>	Spanien <i>Spain</i> 2.458 km

Flere hollandskmærkede unger er aflæst i Danmark, og det er sandsynligt at den nuværende danske bestand stammer herfra. I fuglenes første sensommer spredes flere mod nord, og der er i Jylland aflæst hollandske ungfugle i august og september. En af disse fugle drog efter den jyske visit til Marokko, hvor den blev aflæst i oktober, og herfra videre til Banc d'Arguin i Mauretania, hvor den blev aflæst i januar. Aflæsningerne af de hollandske skestorker giver i det hele taget indtryk af, at fuglene kommer meget omkring, og en skestork er i løbet af fire år blevet aflæst adskillige gange i Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien og England. Denne fugl blev to vintre i træk aflæst flere gange i det nordlige Spanien, hvor den sandsynligvis har overvintret. I skrivende

stund blev skestorken sidst aflæst på Skjern Enge i slutningen af maj i 2002 (O. Overdijk pers. medd.)

Af skestorkene, som blev ringmærket i Danmark, er tre blevet skudt og en fundet død.

### English summary

*In 1996 the spoonbill bred in Denmark after an absence of 27 years. In 2004 the population was 27 breeding pairs. The first spoonbill was ringed in the 1940s, and in total 16 have been ringed. Four birds have been recovered, all in the first autumn after ringing, two in France and two in Spain. Five spoonbills from the population in the Netherlands have been found in Denmark, some in their first autumn (August and September). One of the Dutch birds that visited Denmark was later recovered in Morocco (October) and Banc d'Arguin (January).*

## Farveringmærkede skestorker

Af Jan Skriver

I 2003 startede et farvemærkningsprojekt, der skal være med til at følge skestorkens indvandring og belyse artens spredning- og trækforhold.

Den 27. juni 2003 blev seks unge skestorker farveringmærket i kolonien i Limfjorden, der talte 11 par. Det var første gang i Danmark, at skestorker blev ringmærket med farvede ringe. Fra 22. juli til 26. august blev de ringmærkede ungfugle jævnlige aflæst på Bygholm Vejle i selskab med op imod et halvt hundrede artsfæller. I begyndelsen af september 2003 blev tre af de farveringmærkede skestorker fra Limfjorden aflæst i Hauke-Haien-Koog i Slesvig-Holsten, hhv. 4. og 9. september. I slutningen af samme måned, den 24. september, blev en af ungerne set i Ruidhorn i Holland (434 kilometer fra mærkningsstedet).

Skestorkene tilbringer sandsynligvis nogle år i artens overvintringsområde som for eksempel Banc d'Arguin i Mauretania. Erfaringerne fra ringmærkning af cirka 3.000 skestorker i Holland (O. Overdijk pers. medd.) fortæller, at der ofte går 3-4 år, før unge skestorker vender tilbage til de områder, hvor de blev født og ringmærket.

I maj 2004 blev der set en fransk farveringmærket skestork i kolonien i Limfjorden, så verdens nordligste skestorker-koloni har bevisligt kontakt til andre kolonier i Nordvesteuropa. Den 5. juli 2004 blev tre skestorker farveringmærket i Limfjordskolonien, der talte 16 par. De ringmærkede fugle blev alle set i august på Bygholm Vejle, og den 14. september blev en af disse ungfugle aflæst ved Klanxbüll i Slesvig-Holsten.