

# Sortand *Melanitta nigra*

## Common scoter



Sortanden yngler i fjeldområderne i Norge og Sverige og i de nordlige egne af Finland, Rusland og Sibirien samt fåtalligt på Island og De Britiske Øer. En væsentlig del af den nordvesteuropæiske sortandebestand overvintrer i de danske farvande, specielt i Kattegat og Østersøen, men i mindre omfang også ud for den nordlige del af Vadehavet (Laursen m.fl. 1997). De danske farvande, specielt Kattegat syd for Læsø og området ud for Vadehavet, er også vigtige som fældningsområde fra juni til og med oktober (Laursen m.fl. 1997). Antallet af sorttænder i Danmark varierer




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokaliteter for sortand ringmærket eller genfundet i Danmark. Linje forbinder mærknings- og genfundingssted. Ringing and recovery locations of common scoter ringed or recovered in Denmark. Line connect ringing and recovery site.

fra år til år (Laursen m.fl. 1997). Det ligger normalt konstant højt vinteren igennem, indtil returtrækket til ynglepladserne starter i slutningen af marts og begyndelsen af april.

I Danmark er der blot ringmærket 37 sorttænder fra 1933 til 2001. Ni fugle blev ringmærket i 2001, og dette er det højeste årlige antal hidtil. Kun tre af de mærkede fugle er genfundet, alle kort tid efter mærkningen. Af de gemeldte fugle var to mærket ved den jyske vestkyst i hhv. oktober 1993 og januar 1990, og én ved Fyns Hoved i februar 1999. Én af fuglene fra den jyske vestkyst (Blåvand) blev en uge senere fundet død på Sylt i Tyskland.

I Danmark er der fundet to sorttænder, mærket i udlandet. En var mærket på Sylt og blev genfundet i Sønderjylland, og en var mærket i Hvidehavet og blev genfundet i Lillebælt (fig. 1). Sidstnævnte blev mærket 24. juni 1973 og skudt 28. februar 1976.

I 1960'erne blev der årligt nedlagt 20.000 sorttænder i Danmark, men antallet er siden faldet til omkring 5.000 (Bregnballe m.fl. 2003).

### English summary

*The common scoter is a frequent visitor to Danish waters. Moulting birds are observed from June to October and many remain in Denmark throughout the winter. Only a few common scoters have been ringed, and the recovered birds were all found shortly after ringing relatively close to the ringing site. A common scoter ringed in the White Sea was shot in the Little Belt on 28 February 1976.*

### Fakta Facts

<b>Mærkninger</b> Birds ringed	37
<b>Genmeldinger</b> Recoveries	
Antal genmeldinger No. of recoveries	3
-heraf uden for Danmark Recovered abroad	1 (33%)
Antal fugle No. of individuals	3
-heraf mærket som unger Ringed as chicks	0
Genmeldingsandel Proportion recovered	8%
Mærket i udlandet, gemeldt i Danmark Ringed abroad, recovered in Denmark	2