


Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

European shag



Topskarven yngler i kolonier ved klippekyster i Vesteuropa fra Ishavet i nord over Island, Færøerne og De Britiske Øer til Nordfrankrig i syd. Andre underarter findes bl.a. i Middelhavet og Sortehavet. De største Europæiske bestande findes på De Britiske Øer og i Norge. Topskarven er en meget sjælden træk- og vintergæst i Danmark, hyppigst i Nordvestjylland. De fleste topskarver overvintrer i nærheden af ynglekolonierne.

Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark er der kun ringmærket to topskarver, i hhv. 1978 og 2000, og de er ikke senere tilbagemeldt.




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokaliteter for topskarv ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=7). Linjer forbinder mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery locations for european shag ringed abroad and recovered in Denmark (n=7). Lines connect ringing and recovery site.

Der er imidlertid fundet syv udenlandske ringmærkede topskarver fra udlandet her i landet (fig. 1). De ringmærkede topskarver er genfundet i perioden 1948-2002 og stammer fra hhv. Norge (2) De Britiske Øer inkl. Kanaløerne (5). Alle fugle var ringmærket som redeunger.

De to norske topskarver er fundet hhv. ved Lønstrup 16. maj 1988 (som toårig) og ved Kalundborg 30. august 2000 (som etårig). De norske topskarver forlader ellers sjældent Norge, og der er kun fundet fire ringmærkede fugle i udlandet ud af mere end 4.500 genfund (Bakken m.fl. 2003).

I de indre danske farvande er desuden genfundet en ringmærket fugl fra øen Guernsey i Den Engelske Kanal (fig. 1). Denne fugle blev fundet druknet i et fiskegarn ved Storebæltsbroen. Fuglen var ringmærket 15. juni 1999 og blev fundet 20. januar 2002.

To ungfugle fra Shetlandsøerne er fundet ved hhv. Hirtshals 5. september 1982 ved kysten af Kattegat i Vorså 15. oktober 1961. Fra Esbjerg er ligeledes genmeldt to ungfugle fra De Britiske Øer. Den ene blev aflæst på havnen den 28. og 30. oktober 2002, og den anden blev skudt 22. september 1948. De britiske ungfugle spredes generelt over større afstande end de voksne, som sjældent genfindes mere end 50-100 km fra kolonierne (Wernham m.fl. 2002).

English summary

The european shag is a rare migrant and winter visitor in Denmark. Seven ringed birds from Norway and Great Britain have been recovered in Denmark, both along the west coast of Jutland and in inner Danish waters. Foreign birds were recovered in August (1), September (2), October (2), January (1) and May (1).