

Tabel A1.4

Ændringer i afstand mellem mærknings- og genfundsted over tid (km/år). n angiver antallet af genfund i den pågældende periode, mens kolonnerne første år og sidste år angiver hhv. første og sidste år med genfund. *Changes in distance between ringing and recovery site over time (km/year). Number of recoveries included and first and last years with recoveries are given.*

Art Species	Fundet død om vinteren Found dead in winter				Fundet død om sommeren Found dead in summer				Fundet død om vinteren mærket som unge Found dead in winter, ringed as chicks			
	Ændring i afstand Change in distance	P	n	År First year Last year	Ændring i afstand Change in distance	P	n	År First year Last year	Ændring i afstand Change in distance	P	n	År First year Last year
Skarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	-16	0,00	708	1947 2002	0	0,87	764	1942 2002	-16	0,00	705	1947 2002
Fiskehejre <i>Ardea cinerea</i>	-4	0,01	576	1911 2002	0	0,75	305	1910 2002	-4	0,00	564	1911 2002
Hvid stork <i>Ciconia ciconia</i>	-122	0,00	40	1915 1998	-12	0,03	243	1909 2000	-114	0,00	38	1915 1998
Knopsvane <i>Cygnus olor</i>	-3	0,42	30	1933 1976	-41	0,02	29	1963 1972				
Grågås <i>Anser anser</i>	-14	0,00	268	1934 2002	-4	0,00	465	1931 2002	-10	0,03	184	1934 2001
Kortnæbbet gås <i>Anser brachyrhynchus</i>	9	0,34	37	1988 2001								
Canadagås <i>Branta canadensis</i>					7	0,73	12	1971 1983				
Knortegås <i>Branta bernicla</i>	62	0,29	14	1960 1966								
Gravand <i>Tadorna tadorna</i>	-16	0,02	37	1940 1998	-1	0,92	10	1958 1977				
Pibeand <i>Anas penelope</i>	-2	0,82	54	1932 1986	11	0,34	17	1962 1989				
Krikanand <i>Anas crecca</i>	1	0,08	574	1907 2002	18	0,31	15	1953 2000				
Gråand <i>Anas platyrhynchos</i>	6	0,00	1678	1916 2000	-6	0,03	295	1919 1999	2	0,21	186	1937 1995
Spidsand <i>Anas acuta</i>	-5	0,08	64	1909 2000	14	0,14	11	1910 1999				
Skeand <i>Anas clypeata</i>	-2	0,86	43	1933 1996								
Rødhovedet and <i>Netta rufina</i>	-13	0,76	26	1957 1972	35	0,41	18	1958 1970				
Taffeland <i>Aythya ferina</i>	-4	0,63	60	1961 1996	24	0,05	47	1958 1991				
Troldand <i>Aythya fuligula</i>	-4	0,05	376	1933 1998	-1	0,90	388	1925 2002				
Ederfugl <i>Somateria mollissima</i>	2	0,00	604	1955 2002	-1	0,03	1065	1927 2002	2	0,14	170	1971 2001
Toppet skallesluger <i>Mergus serrator</i>					7	0,06	21	1935 2001				
Duehøg <i>Accipiter gentilis</i>	0	0,53	78	1907 2002	0	0,99	323	1911 2002	0	0,50	76	1907 2002
Spurvehøg <i>Accipiter nisus</i>	-1	0,61	148	1918 2001	0	0,67	204	1916 2001	-5	0,00	107	1918 2001
Musvåge <i>Buteo buteo</i>	-2	0,01	192	1906 1997	0	0,69	84	1907 2000	-1	0,11	134	1906 1997
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	-2	0,44	86	1918 2002	-1	0,41	64	1948 2002	0	0,83	75	1918 2002
Agerhøne <i>Perdix perdix</i>	0	0,90	18	1927 1989	0	0,18	10	1929 1986				
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	0	0,25	17	1928 1985								
Grønbenet rørhøne <i>Gallinula chloropus</i>	5	0,47	24	1950 1991	-2	0,61	22	1953 1999				
Bliðshøne <i>Fulica atra</i>	-13	0,00	160	1931 1995	-2	0,41	85	1935 1995	-12	0,18	28	1931 1983
Strandskade <i>Haematopus ostralegus</i>	-2	0,28	87	1930 1999	-1	0,20	58	1929 1999	0	0,96	39	1930 1999
Klyde <i>Recurvirostra avosetta</i>	-1	0,77	137	1925 1990	4	0,19	56	1929 1998	-1	0,57	120	1925 1990
Stor præstekrave <i>Charadrius hiaticula</i>	-28	0,00	17	1927 1997	2	0,88	15	1924 1984	-27	0,01	12	1927 1997
Hjelle <i>Pluvialis apricaria</i>	-2	0,95	14	1953 1971								
Vibe <i>Vanellus vanellus</i>	2	0,40	295	1920 1997	0	0,79	84	1924 1992	0	0,93	230	1920 1997
Almindelig tytte <i>Calidris alpina</i>	3	0,57	140	1952 1992								
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	109	0,21	14	1959 1978								
Dobbeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i>	6	0,28	71	1927 1999								
Skovsneppe <i>Scolopax rusticola</i>	5	0,28	85	1940 1997								
Stor regnspejle <i>Numenius arquata</i>	-3	0,88	15	1959 1987	-5	0,73	19	1970 1997				
Rødben <i>Tringa totanus</i>	7	0,26	192	1930 1980	2	0,77	28	1931 1989	25	0,01	16	1930 1978
Sortklire <i>Tringa erythropus</i>	15	0,69	14	1954 1974								
Hættemåge <i>Larus ridibundus</i>	-6	0,00	689	1913 2002	1	0,56	277	1923 2002	-3	0,01	462	1913 2002
Stormmåge <i>Larus canus</i>	-8	0,00	417	1913 2002	1	0,20	277	1922 2002	-3	0,01	301	1913 2002
Sildemåge <i>Larus fuscus</i>	-59	0,01	23	1937 1997	-5	0,00	222	1927 2002	-64	0,02	22	1937 1997
Sølvmåge <i>Larus argentatus</i>	0	0,80	835	1918 2002	0	0,01	2984	1918 2002	0	0,68	750	1918 2002
Svartbag <i>Larus marinus</i>	-2	0,31	111	1952 2002	-2	0,19	227	1957 2002	-2	0,36	101	1952 2002
Ride <i>Rissa tridactyla</i>	-25	0,05	14	1951 1993	-46	0,02	21	1947 1996				
Sandterne <i>Gelochelidon nilotica</i>					-15	0,49	11	1922 1960				
Splitterne <i>Sterna sandvicensis</i>	4	0,67	186	1930 2002	-42	0,00	273	1930 2000	1	0,87	179	1930 2002

Art Species	Fundet død om vinteren Found dead in winter					Fundet død om sommeren Found dead in summer					Fundet død om vinteren mærket som unge Found dead in winter, ringed as chicks				
	Ændring i afstand Change in distance	P	n	Første år First year	Sidste år Last year	Ændring i afstand Change in distance	P	n	Første år First year	Sidste år Last year	Ændring i afstand Change in distance	P	n	Første år First year	Sidste år Last year
Fjordterne	59	0,17	21	1933	1994	-10	0,27	44	1937	2000	98	0,04	18	1935	1994
Havterne															
<i>Sterna paradisaea</i>															
Dværgeterne															
<i>Sternula albifrons</i>															
Lomvie															
<i>Uria aalge</i>	0	0,71	68	1930	1993	-1	0,69	22	1936	1996	1	0,68	15	1930	1989
Alk															
<i>Alca torda</i>	0	0,87	36	1929	2001	-16	0,16	24	1980	2000	0	0,96	34	1929	2001
Tejst															
<i>Cephus grylle</i>	0	0,72	140	1930	2002	0	0,21	42	1937	1998					
Ringdue															
<i>Columba palumbus</i>	-6	0,24	22	1923	1996	0	0,50	182	1920	1998					
Tyrkerdue															
<i>Streptopelia decaocto</i>	-2	0,52	31	1956	1993	2	0,45	27	1965	1996					
Sjørugle															
<i>Tyto alba</i>	0	0,92	22	1929	2002	0	0,06	52	1927	2002					
Kirkeugle															
<i>Athene noctua</i>	0	1,00	15	1921	2000	0	0,77	10	1936	2000					
Natugle															
<i>Strix aluco</i>	0	0,98	102	1926	2001	0	0,74	188	1926	2002					
Skovhornugle															
<i>Asio otus</i>	4	0,32	17	1931	2000	20	0,02	14	1951	1989					
Sortspætte															
<i>Dryocopus martius</i>															
Stor flagspætte															
<i>Dendrocopos major</i>	0	0,53	14	1922	1981	0	0,12	15	1973	1992					
Digesvale															
<i>Riparia riparia</i>															
Landsvale															
<i>Hirundo rustica</i>															
Bysvale															
<i>Delichon urbicum</i>															
Hvid vipstjert															
<i>Motacilla alba</i>						5	0,19	16	1927	1987					
Vandstær															
<i>Cinclus cinclus</i>	1	0,38	10	1961	2002										
Gærdesmutte															
<i>Troglodytes troglodytes</i>	-3	0,55	33	1933	2000	2	0,31	35	1926	2002					
Jernspurv															
<i>Prunella modularis</i>	-17	0,27	16	1950	1995	6	0,48	14	1928	1996					
Rødhals															
<i>Erithacus rubecula</i>	15	0,04	85	1939	1996	16	0,19	12	1946	1989					
Rødstjert															
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>															
Solsort															
<i>Turdus merula</i>	2	0,09	450	1922	2002	1	0,00	1214	1922	2002	-7	0,00	69	1922	1993
Slagger															
<i>Turdus pilaris</i>	17	0,25	29	1960	1995	-18	0,09	21	1968	1993					
Sangdrossel															
<i>Turdus philomelos</i>	6	0,00	347	1926	2002	6	0,01	94	1925	1986	-1	0,80	63	1926	1982
Vindrossel															
<i>Turdus iliacus</i>	-2	0,88	25	1962	1997										
Gærdesanger															
<i>Sylvia curruca</i>						3	0,04	21	1927	1995					
Tornsanger															
<i>Sylvia communis</i>						3	0,69	13	1968	1993					
Munk															
<i>Sylvia atricapilla</i>						7	0,42	11	1975	1997					
Løvsanger															
<i>Phylloscopus trochilus</i>						3	0,81	19	1966	1992					
Fuglekonge															
<i>Regulus regulus</i>															
Brogæt fluesnapper															
<i>Ficedula hypoleuca</i>						4	0,00	86	1927	2001					
Sumptmeise															
<i>Poecile palustris</i>						0	0,83	18	1928	1987					
Sortmeise															
<i>Pariparus ater</i>						0	0,06	22	1932	2001					
Musvit															
<i>Parus major</i>	1	0,01	70	1926	1998	0	0,12	75	1928	2001	0	0,04	13	1926	1971
Spætmeise															
<i>Sitta europaea</i>	0	0,39	240	1925	2002	0	0,36	456	1925	2002	0	0,75	87	1925	1999
Skovskade															
<i>Garrulus glandarius</i>	0	0,89	22	1930	1993	0	0,18	14	1932	1996	4	0,37	10	1930	1972
Husskade															
<i>Pica pica</i>	0	0,45	43	1919	1996	0	0,75	55	1923	1996	1	0,30	24	1919	1974
Allike															
<i>Corvus monedula</i>	-5	0,05	47	1917	1990	0	0,36	135	1917	1997	-4	0,17	22	1917	1990
Råge															
<i>Corvus frugilegus</i>	-3	0,01	31	1930	1990	1	0,32	94	1921	1996	-4	0,13	10	1930	1988
Krage															
<i>Corvus corone</i>	-1	0,49	12	1937	2002	1	0,89	13	1959	1994					
Gråkrage															
<i>Corvus cornix</i>	-1	0,66	78	1922	1996	8	0,00	190	1925	2002					
Ravn															
<i>Corvus corax</i>						-2	0,15	13	1927	2000					
Stær															
<i>Sturnus vulgaris</i>	-2	0,09	387	1901	1999	1	0,00	1090	1901	2002	-3	0,09	85	1921	1997
Graspurv															
<i>Passer domesticus</i>	0	0,55	48	1936	1999	0	0,33	243	1921	2002					
Skovspurv															
<i>Passer montanus</i>	0	0,14	25	1952	2002	0	0,06	113	1929	2000					
Bogfinke															
<i>Fringilla coelebs</i>	-3	0,38	60	1928	2001	0	0,79	89	1926	2002					
Kvækerfinke															
<i>Fringilla montifringilla</i>	-2	0,81	63	1940	2001										
Grønirisk															
<i>Carduelis chloris</i>	1	0,15	441	1925	2002	2	0,00	330	1926	2002					
Grønrisiken															
<i>Carduelis spinus</i>	1	0,93	15	1968	2001										
Tornirisk															
<i>Carduelis cannabina</i>						0	0,67	31	1927	1996					
Dompap															
<i>Pyrhula pyrhula</i>	1	0,67	32	1966	2002	-3	0,53	22	1966	1999					
Gulspurv															
<i>Emberiza citrinella</i>	0	0,82	24	1942	1995	1	0,66	50	1927	1994					